

#MONKEYPOX

Actualmente, el virus de la viruela del mono circula en Francia y en el resto del mundo.

TRANSMITE

Se transmite por contacto directo con los granos o costras de la piel de una persona enferma, o por compartir ropa de casa (toallas, sábanas...) o útiles de aseo (maquinilla de afeitar, cepillo de dientes). La tos y los estornudos también pueden transmitir la enfermedad.

Las relaciones sexuales, con y sin penetración, también constituyen un riesgo de contagio. Un enfermo se puede contagiar desde la aparición de los síntomas hasta la desaparición de las costras (de 15 a 21 días). Mientras no haya síntomas, no hay riesgo de transmisión.

SI TIENE ESTOS
SÍNTOMAS,
aíslese y contacte con
su médico

O LLAME AL 15

SÍNTOMAS

Si Usted cree haber estado expuesto, vigile si aparece alguno de los síntomas **siguientes entre 5 y 21 días** después de la exposición :

- Granos en la cara, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, genitales, torso o miembros,
- fiebre,
- dolor de cabeza,
- dolor de garganta,
- dolores musculares,
- fatiga,
- ganglios dolorosos bajo la mandíbula, a nivel del cuello o del pliegue de la ingle.

En la mayoría de los casos, la enfermedad se cura sola en unas 3 semanas, el aislamiento debe mantenerse durante todo ese tiempo.

iledefrance.ars.sante.fr

